

Zalecane* modyfikacje dawkowania u pacjentów z neuropatią związaną z przyjmowaniem bortezomibu.

Ciężkość neuropatii	Modyfikacja dawkowania
Stopnia 1. (parestezje, osłabienie i (lub) zniesienie odruchów) bez występowania bólu lub utraty funkcji	Bez zmiany
Stopnia 1. z bólem lub stopnia 2. (z zaburzeniami funkcji, ale nie utrudniający codziennej aktywności)	Redukcja dawki do 1,0 mg/m ² pc.
Stopnia 2. z bólem lub stopnia 3. (z utrudnieniami w codziennej aktywności)	Należy przerwać leczenie produktem VELCADE do momentu ustąpienia objawów toksycznych. Po ustąpieniu objawów działania toksycznego, leczenie produktem VELCADE należy rozpocząć ponownie w zredukowanej do 0,7 mg/m ² pc. dawce, zmieniając jednocześnie schemat leczenia na raz w tygodniu.
Stopnia 4. (neuropatia czuciowa, która zaburza funkcjonowanie lub neuropatia ruchowa zagrażająca życiu lub prowadząca do porażenia) i (lub) ciężka neuropatia autonomicznego układu nerwowego	Należy odstawić produkt VELCADE

*W oparciu o badania kliniczne II i III fazy nad modyfikacją dawkowania w leczeniu szpiczaka mnogiego oraz doświadczenie zebrane po wprowadzeniu produktu do obrotu.