



WYKREŚLANKA

Znajdź słowa dotyczące mierzalnej choroby resztkowej (measurable residual disease, MRD)
CYTOMETRIA, POLIMERAZA, REMISJA, MIERZALNA, REAKCJA, MRD, NAWRÓT, OSTRABIAŁACZKASZPIKOWA,
CHOROBA, SZPIKOSTNY, SEKWENCJONOWANIE, NEGATYWNA

W C S V F T O H D U G Y Q A J T V O J H R N G X Y
V C Q H A G E J D N C H F N I P Y Q M Q P P K G R
C Y H D T Z N C H M Y T M G M B J L R E M I S J A
T T P S R F O N O J H B D C O T M I E R Z A L N A
P O L I M E R A Z A J J A C L Z U N A J K N Q S R
M M X W R H L D P Y Q Ó B I O U V Ń K G C V G G I
R E S Z E E F P O F M L I M K N C V C G Y P W G S
T T N K Q K C C F L M Ć S R C K R I J V T K P F E
Y R T T J V L Ł Q M T M V D V K L S A P M U H J K
U I M R B F K B R X L W N R Z H B C P E R W M Ć W
Q A G E R P D R X Ć Ż V N Z K R F R J V X K B V E
S C X Z K G N Ń P A H G V Z J A V A D M L L G H N
O S T R A B I A Ł A C Z K A S Z P I K O W A S J C
P N L M X W X L S S H P T T Z F Z S C Ś Z B L G J
Z I M I O U H L D R O Ż Y Z P A Ł C L T E G S J O
F Ć S Z I G S K T B R V N U I D A M M F V Q N X N
A G V I R H S T Y N O N H V K R A I K Q B G Ó V O
J H T V R P O F S M B L I I K Y G P C M M F Q T W
B L B L E F Q F P S A K O L O T M D R Ś J K L L A
S F Y S M G V Q Z Ł K N I X S G V B G I F X Q K N
R U J V I B B J K V I C V V T C M N G V Z C F N I
W X Y G S N C E L B B P Ż Z N X Y Z P M G N B Q E
G M K B J B L R S Z M E U Q Y S Z C G M K R T Z S
V J C N A W R Ó T M P T Y R N I C E L L H N Ż V L
G G L S N Z I S P M K V N E G A T Y W N A C K L U

☐ OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA

rodzaj nowotworu, który zajmuje krew oraz szpik kostny

☐ SZPIK KOSTNY

płynna tkanka wypełniająca niektóre kości, odpowiedzialna za produkcję komórek krwi

☐ CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA

badanie powszechnie używane do monitorowania MRD, w którym próbki szpiku są badane pod kątem obecności komórek białaczkowych poprzez oznaczanie markerów białkowych na powierzchni komórek

☐ MIERZALNA CHOROBA RESZTKOWA

mała ilość komórek białaczkowych, która może pozostać w organizmie po zakończeniu leczenia – w skrócie MRD

☐ NEGATYWNA MRD

sytuacja, kiedy komórki białaczkowe w szpiku są niewykrywalne, nawet przy czułości badania 1 na milion komórek

☐ SEKWENCJONOWANIE NOWEJ GENERACJI

badanie, w którym stosowane są różne metody sekwencjonowania DNA lub RNA, które pozwala na wykrycie 1 komórki białaczkowej wśród 1 miliona zdrowych komórek. Dzięki tej metodzie możliwe jest również oznaczenie mutacji obecnych w DNA, co umożliwia dobór celowanego leczenia

☐ ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY

badanie powszechnie stosowane w ocenie MRD, które wykrywa komórki białaczkowe poprzez powielanie ich markerów DNA. Pozwala wykryć komórki białaczkowe z czułością 1 na milion komórek.

☐ REMISJA

sytuacja, w której komórki białaczkowe w szpiku są całkowicie nieobecne, a parametry morfologiczne krwi i szpiku kostnego powróciły do zakresu normy

☐ NAWRÓT

sytuacja, kiedy białaczka powraca po osiągnięciu całkowitej remisji